



Child Care Virtual Office Hours RIDOH COVID-19 Child Care Team

May 17, 2022

Presented by: Julia Brida, COVID-19 Child Care Program Manager

**RHODE
ISLAND**

Agenda

01

Community Levels

04

Testing Resources

02

Masking
Recommendations


05

Test to Stay

03

Stable Pods

COVID-19 Community Levels in Rhode Island



- All Rhode Island counties are currently *medium*-risk communities according to CDC's COVID-19 Community Levels.
- What bumped the counties up to medium was having **at least 200 cases per 100,000 people**.
- This shift alerts us to increased risk for individuals and the need to monitor hospitalizations closely.
- The indicators are intended to predict hospital intensive care unit (ICU) bed utilization and deaths. There's a 3-week lag between shifting levels and hospital impacts.
- COVID-19 community levels can inform recommendations for [community-level preventive strategies](#) and individual preventive behaviors.
 - RIDOH's [COVID-19 Data Hub](#) shows the COVID-19 Community Levels (according to CDC's data and analysis)

Masking is Recommended:

- Universally in indoor settings when community level is high
- When an exposure occurs at child care and close contacts (ages 2+) are implementing Monitor to Stay/Test to Stay
- After an individual with COVID-19 has completed a 5-day isolation period.
 - The Individual should mask for the following 5 days (days 6-10). **A person who has had COVID-19 has a 30% chance of still being infectious on day 6.**
 - Providers may choose to require masking on days 6-10 or should communicate a “parent’s choice” approach to encourage parents to have their child mask on days 6-10.
 - Since children younger than 2 cannot mask, it is recommended they isolate for 10 days.



[Science Brief: Options to Reduce Quarantine for Contacts of Persons with SARS-CoV-2 Infection Using Symptom Monitoring and Diagnostic Testing | CDC](#)

At High Community Levels, Stable Pods are Recommended

- Staff should limit floating between classes. If programs need to utilize float staff, it is recommended they mask at all times and stay [up-to-date](#) with their COVID-19 vaccinations.
- Children should remain in their stable pod. Limit mixing/mingling in the AM/PM, during outdoor playtime, during nap or mealtime, etc.
- Programs should consider additional ventilation with open windows and extra time outdoors as warmer weather permits.



COVID-19 Testing Resources

- Testing provided by the child care provider
- Health Care Provider, Primary Care Provider, and Pediatrician
- Respiratory Clinics or Urgent Care Centers
- Retail Pharmacies (e.g., CVS, Walgreens, etc.)
- Self-tests administered at home
 - Available at local pharmacies and through online retailers. Private health insurers are required to cover the cost of up to eight tests per month. Check your insurance company's policy to see how you can get reimbursed or if you need to file a claim. Medicaid also provides coverage for self- test kits in Rhode Island. Some Medicare plans cover self-test kits.
- State-run sites if the person has symptoms or has been identified as a close contact (through June 30, 2022)



COVID-19 Testing Resources Cont.

- There are places in Rhode Island that offer free testing for people who don't have insurance. If you don't have insurance and don't know whether a site offers free testing, call the site to confirm before making an appointment.
 - Federal programs, like the [Increase Community Access to Testing \(ICATT\) Program](#), or the [Test to Treat Program](#), are available to support access to free COVID-19 testing for people with and without health insurance.
 - Non-profit child care programs may request free tests through RIDOH [here](#). Resources will be prioritized to programs in the following zip codes: 02860, 02861, 02863, 02893, 02895, 02904, 02905, 02906, 02907, 02908, 02909, 02910, 02911, 02914, 02919, 02920
 - Free self-tests can be ordered online by visiting: covidtests.gov.

Resources for free masks:

- Free masks for non-profit programs can be requested from RIDOH [here](#).
- [Find Free Masks \(N95 Respirators\) | CDC](#).



Test to Stay (TTS)

- **TTS is the recommended quarantine approach (for ages 2+) when community level is high.** Programs should be proactive and have families sign the TTS consent form ahead of implementing TTS.
 - A TTS consent template can be found on the DHS website under handbooks and forms [here](#).
- TTS supplies from RIDOH will be available through June 30, 2022, and can be requested [here](#).
- Programs choosing to implement TTS will need to plan their test supply in the event the community level reaches high after June 30. Resources have been outlined on previous slides.



FAQ: Should I still require a PCR test for staff or children to return to child care?

- Rapid antigen tests (administered at child care or as a self-test at home) are sufficient as options for staff and children to use in order to return to child care if testing is required.
- Rapid antigen tests have a quick result turnaround time (15-30 minutes) and the tests are easy to access.

Reporting COVID-19 Cases to RIDOH

- All positive COVID-19 test results are expected to be reported to the RIDOH COVID-19 Child Care team, **including self-tests**.
 - Report cases to ridoh.covidchildcare@health.ri.gov or via the hotline at 401-222-8022
 - Self-test results should be entered into the **RIDOH self-test portal** [here](#).
- Report the following information:
 - Name and Date of Birth (DOB) of the positive case; testing date and test type (antigen, PCR, self-test) ; symptom onset date, if symptomatic, or note “asymptomatic”; positive case’s last date on site; name(s) of classroom impacted; # of staff/students impacted; Your phone # for follow up
- When inquiries are high, it may take longer than usual for us to respond. In the meantime, please refer to the Child Care [Playbook](#) for guidance recommendations. Slide 36 highlights our recommendations based on your community level, which can be found on RIDOH’s data hub [here](#).





Horario de oficina virtual de cuidado infantil Equipo de cuidado infantil RIDOH COVID-19

17 de mayo de 2022

Presentado por:


Jennifer Solares, Investigadora principal de casos de cuidado infantil de COVID-19

RHODE
ISLAND

Agenda

- 01 Niveles de la comunidad
- 02 Recomendaciones de enmascaramiento
- 03 Grupos estables
- 04 Recursos de prueba
- 05 Test to Stay

Datos



- Los condados de Rhode Island actualmente son comunidades de riesgo medio según los niveles comunitarios de COVID-19 de los CDC.
- Lo que llevó a los condados al nivel medio fue tener al menos 200 casos por cada 100,000 personas.
 - Este cambio nos alerta sobre un mayor riesgo para las personas y la necesidad de monitorear de cerca las hospitalizaciones.
- Los indicadores están destinados a predecir la utilización de camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) del hospital y las muertes. Hay un retraso de 3 semanas entre los niveles cambiantes y los impactos en el hospital.
- Los niveles comunitarios de COVID-19 pueden informar recomendaciones para [estrategias preventivas a nivel comunitario](#) y comportamientos preventivos individuales.
 - [El centro de datos de COVID-19](#) de RIDOH muestra los niveles comunitarios de COVID-19 (según los datos y análisis de los CDC)

Se recomienda enmascarar:

- Universalmente en entornos interiores cuando el nivel de la comunidad es alto
- Cuando ocurrió una exposición en el cuidado infantil y los contactos cercanos (mayores de 2 años) siguen Monitor to Stay/Test to Stay
- Después de que una persona con COVID-19 haya completado un período de aislamiento de 5 días.
- El Individuo debe usar mascarilla durante los siguientes 5 días (días 6-10). **Una persona que ha tenido COVID-19 tiene un 30 % de posibilidad de seguir siendo infecciosa el día 6.**
- Los proveedores pueden optar por exigir el uso de cubrebocas los días 6 a 10 o deben comunicar un enfoque de "elección de los padres" para alentar a los padres a que sus hijos usen cubrebocas los días 6 a 10
- Dado que los niños menores de 2 años no pueden usar cubrebocas, se recomienda que se aislen durante 10 días.
- [Informe científico: Opciones para reducir la cuarentena de contactos de personas con infección por SARS-CoV-2 mediante el monitoreo de síntomas y pruebas de diagnóstico | CDC](#)



Se recomiendan grupos estables cuando el nivel de la comunidad es alto

- El personal debe limitar la flotación entre clases. Si los programas necesitan utilizar personal flotante, se recomienda que usen máscaras en todo momento y se mantengan al día con sus vacunas contra el COVID-19.
- Los niños deben permanecer en su grupo estable. Limite las mezclas en la mañana y la tarde, durante el tiempo de juego al aire libre, durante la siesta o la hora de comer, etc.
- Los programas también deben considerar ventilación adicional con ventanas abiertas y tiempo adicional al aire libre a medida que el clima más cálido lo permita.



Recursos de prueba

- Pruebas proporcionadas en su programa de cuidado infantil
- Proveedor de atención médica, proveedor de atención primaria y pediatra
- Clínicas Respiratorias o Centros de Atención Urgente
- Farmacias minoristas (por ejemplo, CVS, Walgreens, etc.)
- Autopruebas realizada en el hogar
 - Están disponibles en farmacias locales y a través de minoristas en línea. Las aseguradoras de salud privadas están obligadas a cubrir el costo de hasta ocho pruebas por mes. Consulte la póliza de su compañía de seguros para ver cómo puede obtener un reembolso o si necesita presentar un reclamo. Medicaid también proporciona cobertura para kits de autoprueba en Rhode Island. Algunos planes de Medicare cubren kits de autoprueba.
- Sitios administrados por el estado si la persona tiene síntomas o ha sido identificada como contacto cercano (hasta el 30 de junio de 2022)



Recursos de prueba

- Hay lugares en Rhode Island que ofrecen pruebas gratuitas para personas que no tienen seguro. Si no tiene seguro y no sabe si un sitio ofrece pruebas gratuitas, llame al sitio para confirmar antes de programar una cita.
 - Los programas federales, como el [Programa de Aumento del Acceso Comunitario a las Pruebas \(ICATT\)](#), o iniciativas de [Prueba para Tratar](#), están disponibles para apoyar el acceso a pruebas gratuitas de COVID-19 para personas sin seguro médico.
- Los programas de cuidado infantil sin fines de lucro pueden solicitar pruebas gratuitas a través de RIDOH [aquí](#). Los recursos se priorizarán para los programas en los siguientes códigos postales: **02860, 02861, 02863, 02893, 02895, 02904, 02905, 02906, 02907, 02908, 02909, 02910, 02911, 02914, 02919, 02920**
 - Envíe un correo electrónico para solicitar ayuda para completar estos formulario:
Dilcia Perdomo dperdomo@riaeyc.org
Alba Escalante aescalante@riaeyc.org
- Se pueden solicitar autopruebas gratuitas en línea visitando: covidtests.gov



Recursos para máscaras gratis:

- Se pueden solicitar mascarillas gratuitas a través de RIDOH [aquí](#).
- [Encuentre mascarillas \(respiradores N95\) gratis | CDC](#)

Test to Stay (TTS)

- TTS es el enfoque de cuarentena recomendado (para mayores de 2 años) cuando el nivel de la comunidad es alto. Los programas deben ser proactivos y hacer que las familias firmen el formulario de consentimiento de TTS antes de implementar TTS
 - Los formularios de ejemplo se pueden encontrar en el sitio web del DHS en manuales y formularios [aquí](#).
- Los suministros de TTS de RIDOH estarán disponibles hasta el 30 de junio de 2022 y se pueden solicitar [aquí](#). Envíe un correo electrónico para solicitar ayuda para completar estos formulario a Dilcia Perdomo: dperdomo@riaeyc.org o Alba Escalante: aescalante@riaeyc.org
- Los programas que elijan implementar TTS deberán planificar su suministro de pruebas en caso de que el nivel de la comunidad alcance un nivel **alto** después del 30 de junio. Los recursos se han descrito en las diapositivas a continuación. RIDOH, junto con DHS, están trabajando para brindar oportunidades de recursos de prueba adicionales para los proveedores en el futuro.



Preguntas frecuentes: ¿Debería seguir requiriendo una prueba de — PCR para que el personal o los niños regresen a la guardería?

- Las pruebas rápidas de antígeno (administradas en el cuidado infantil o como una autoprueba en el hogar) son opciones suficientes para que el personal y los niños las usen para regresar al cuidado infantil si se requiere la prueba.
- Las pruebas rápidas de antígeno tienen un tiempo de respuesta de resultados rápido (15-30 minutos) y las pruebas son de fácil acceso.

Notificación de casos de COVID-19 a RIDOH

• Se espera que todos los resultados positivos de la prueba de COVID-19 se informen al equipo de cuidado infantil de RIDOH COVID-19, incluidas las autopruebas.

- Los casos se pueden informar a ridoh.covidchildcare@health.ri.gov o a través de la línea directa al 401-222-8022
- Los resultados de autoprueba deben ingresarse en el **portal de autopruebas de RIDOH** [aquí](#)



Si está reportando un caso, por favor reporte la siguiente información:

- Nombre y fecha de nacimiento del caso positivo; fecha de prueba y tipo de prueba (rápida, PCR, autoprueba) ; fecha de inicio de los síntomas, si es sintomático, o nota "asintomático"; última fecha del caso positivo en el sitio; nombre(s) del salón de clases afectado; # de personal/estudiantes afectados; Su número de teléfono para seguimiento
- El número de consultas son altas y pueden tardar más de lo habitual en responder. Haremos todo lo posible para comunicarnos con usted tan pronto como podamos. Mientras tanto, consulte el [Playbook de Cuidado Infantil](#) para obtener recomendaciones de orientación. En la diapositiva 36 se destacan nuestras recomendaciones basadas en el nivel de su comunidad, que se pueden encontrar en el centro de datos de RIDOH [aquí](#).